

**Типовые тесты вступительного испытания
направления «Внутренние болезни»**

1. Клинико-лабораторными признаками внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите считается:

- А. «Опоясывающая» боль в верхней части живота.
- Б. Снижение массы тела.
- В. Неоформленный стул.
- Г. Частая неукротимая рвота.
- Д. Гипергликемия.

Ответ: д

2. К лабораторным признакам синдрома холестаза относятся:

- А. Повышение уровня АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
- Б. Гипохолестеринемия, прямая гипербилирубинемия.
- В. Гипергаммаглобулинемия, веprямая гипербилирубинемия.
- Г. Повышение уровня ЩФ, гамма-глутамилтранспептидазы, повышение уровня прямого билирубина.

Ответ: г

3. Клиническими признаками степени тяжести циррозов печени по Child-Pugh являются:

- А. Лихорадка, полиневриты, желтуха.
- Б. Спленомегалия, петехии и геморрагии, снижение массы тела.
- В. Гепатомегалия, носовые кровотечения, олигурия.
- Г. Асцит, неврологические нарушения, дефицит веса.
- Д. Варикозно-расширенные вены пищевода, периферические отеки, асцит.

Ответ: г

4. Этиологическим фактором гломерулонефритов может быть:

- А. Тяжелый физический труд.
- Б. Сильный эмоциональный стресс.
- В. АГ.
- Г. Стеноз почечной артерии.
- Д. Инфекция.

Ответ: д

5. Для острого нефритического синдрома характерна:

- А. Протеинурия до 3 г/сут.
- Б. Протеинурия более 3,5 г/сут.
- В. Гиперлипидемия.
- Г. Гипопротеинемия.
- Д. Гиперпротеинемия.

Ответ: а

6. При железодефицитной анемии выявляются:

- А. Сухость, бледность кожи, ломкость ногтей, тахикардия, мягкий, дующий систолический шум на верхушке.
- Б. Диффузный цианоз, акцент II тона во втором межреберье слева от грудины.
- В. Покраснение кожи лица, зоны декольте.
- Г. Трехцветное изменение кожи дистальных отделов верхних и нижних конечностей на холоде.
- Д. Крапивница, зуд, отек гортани.

Ответ: а

- 7. Степень активности хронического гепатита определяется по:**
- А. Степени повышения концентрации билирубина в крови.
 - Б. Степени повышения концентрации АЛТ и АСТ в крови.
 - В. Степени повышения концентрации у-глутамилтранспептидазы в крови
 - Г. Степени снижения концентрации альбумина в крови.
 - Д. Степени повышения СОЭ.
- Ответ: б
- 8. Что такое постпрандиальная гликемия?**
- А. Это гликемия после пробуждения.
 - Б. Это гликемия через 2 ч после приема пищи.
 - В. Это гликемия через 8 ч после приема пищи.
 - Г. Это гликемия до приема пищи.
 - Д. Это гликемия перед сном.
- Ответ: б
- 9. Для острого подагрического артрита нехарактерно:**
- А. Одностороннее поражение первого плюснефалангового сустава.
 - Б. Утренняя скованность в суставах.
 - В. Гиперемия кожи над воспаленным суставом.
 - Г. Воспаление сустава, достигающее максимума в 1-й день болезни.
 - Д. Болезненность при пальпации пораженного сустава.
- Ответ: б
- 10. Какой уровень гликемии через 2 ч после глюкозотолерантного теста или гликемии, определенной в любое время суток, считается диагностическим критерием СД:**
- А. $>9,1$ ммоль/л в венозной плазме или капиллярной цельной крови.
 - Б. $>10,1$ ммоль/л в венозной плазме или капиллярной цельной крови.
 - В. $>11,1$ ммоль/л в венозной плазме или капиллярной цельной крови.
 - Г. $>12,1$ ммоль/л в венозной плазме или капиллярной цельной крови.
 - Д. $>13,1$ ммоль/л в венозной плазме или капиллярной цельной крови.
- Ответ: в